

Frottis cervico-vaginal



Données techniques

Conseils patients / Conseils officinal

Résultats et normes



Données Techniques

Définition

Le frottis cervico-vaginal est un examen de dépistage du cancer du col de l'utérus qui consiste à prélever des cellules superficielles au niveau du col de l'utérus. Selon l'aspect cellulaire, le col est considéré comme normal ou siège d'une infection, d'une lésion pré-cancéreuse ou d'un cancer. Les lésions précancéreuses et cancéreuses sont essentiellement liées au virus HPV (Human Papilloma Virus), virus sexuellement transmissible. Cinq à six millions de frottis sont effectués chaque année en France.

Méthode

Recueil de cellules de l'exocol et de l'endocol utérin par prélèvement direct à l'aide d'une spatule ;

Étalement sur lame de manière uniforme et fixation immédiate (frottis de Papanicolaou) ;

Le matériel peut être mis en suspension dans un flacon contenant un liquide de conservation ;

Envoi au laboratoire pour analyse cytologique au microscope.

Indications

Indications ⁱ

- Dépistage systématique des cancers du col utérin chez les femmes de 25 à 65 ans, tous les trois ans après 2 frottis négatifs à un an d'intervalle ;
- Surveillance de frottis anormal ;
- Surveillance après chirurgie conservatrice sur lésion néoplasique du col de l'utérus (conisation).



Conseils patients / Conseil officinal

Préparation à l'examen

- Pas de rapports sexuels dans les 48 heures précédant l'examen ;
- Prélèvement à effectuer en

INFORMATIONS DE PUBLICATION

Source : Médecin des Hôpitaux - Praticien Hospitalier ; Urgences médico-chirurgicales et judiciaires, SMUR; Hôtel-Dieu-Cochin (Paris); Université Paris Descartes

Créé le : 23/02/2010 | Mis à jour le : 24/03/2010

dehors des périodes
menstruelles, de toute
thérapeutique locale ou
d'infection et si nécessaire
après traitement
œstrogénique chez la femme
ménopausée ;

Conditions de l'examen

- Réalisation par le gynécologue, le médecin généraliste ou au laboratoire d'analyses médicales par un personnel formé ;
- Pas de toucher vaginal avant le frottis ;
- Pose d'un spéculum sans lubrifiant idéalement ;
- Le col doit être correctement exposé et le prélèvement doit concerner la totalité de l'orifice cervical externe et l'endocol.
- Résultats non disponibles immédiatement et envoyés dans un second temps.



Résultats et Normes

Normes

Le compte-rendu doit être formulé selon le système de Bethesda.

Le compte rendu précise :

- Absence de lésion malpighienne intra-épithéliale ou de signe de malignité (NIL/M) ;
- Ou anomalies des cellules malpighiennes ;
- Ou anomalies des cellules glandulaires.

Variations

En cas d'anomalie ou atypies des cellules malpighiennes par exemple, plusieurs options sont possibles :

- soit une colposcopie d'emblée ;
- soit un frottis de contrôle 6 mois plus tard ;
- soit une recherche des HPV potentiellement oncogènes.

¹ Haute Autorité de Santé. [Conduite à tenir devant une patiente ayant un frottis cervico-utérin anormal. 2002.](#)

Date de création et de mise en ligne de la fiche : 23-02-2010.

Les éléments d'informations et conseils qui y figurent sont d'ordre général et ne sont pas exhaustifs. Ils ne peuvent se substituer au diagnostic et aux conseils du pharmacien adaptés à la situation du patient. Le pharmacien est entièrement responsable de l'usage et des interprétations qu'il fait des informations qu'il consulte et des conseils qu'il en déduit ou des actes qu'il effectue. En conséquence, l'utilisateur des fiches s'interdit de mettre OCP et l'auteur en cause pour un litige qui serait né de l'exploitation de ces éléments d'information et conseils.

© OCP - 2008

INFORMATIONS DE PUBLICATION

Source : Médecin des Hôpitaux - Praticien Hospitalier ; Urgences médico-chirurgicales et judiciaires, SMUR; Hôtel-Dieu-Cochin (Paris); Université Paris Descartes

Créé le : 23/02/2010 | Mis à jour le : 24/03/2010