


Désormais disponible sans prescription 



L'amour n'a pas changé

La contraception d'urgence, oui.

ellaOne[®]

ulipristal acétate 30 mg comprimé

En questions

HRAPharma



ellaOne®

ulipristal acétate 30 mg comprimé

QUESTIONS FRÉQUENTES

Indication :

Contraception d'urgence dans les 120 heures (5 jours) suivant un rapport sexuel non protégé ou en cas d'échec d'une méthode contraceptive.

Contre-indication :

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

SOMMAIRE

	Pages
1 • Mode d'action d'ellaOne®	4
2 • Posologie et mode d'administration	4
3 • Effets indésirables	5
4 • ellaOne® et interactions médicamenteuses	6
5 • ellaOne® et saignements	7
6 • ellaOne® et règles	7
7 • Peut-on associer ellaOne® et d'autres progestatifs au cours d'un même cycle ?	8
8 • Quand suspecter un échec d'ellaOne® ? Quand faire un test de grossesse ?	9
9 • ellaOne® et grossesse	10
10 • Peut-on prendre ellaOne® si on allaite ?	11
11 • ellaOne® et IST	12
12 • Délivrance d'ellaOne® en pharmacie	13

- ellaOne® est un modulateur sélectif des récepteurs de la progestérone qui **inhibe ou retarde l'ovulation** ⁽¹⁾.
- ellaOne® n'est pas abortif ⁽²⁾.

2 Posologie et mode d'administration ⁽¹⁾

- **1 comprimé à prendre le plus rapidement possible** dans les 120 heures (5 jours) après un rapport sexuel non protégé ou en cas d'échec d'une méthode contraceptive.
- Le comprimé peut être pris **au cours ou en dehors des repas**.
- En cas de vomissements dans les 3 heures suivant la prise d'ellaOne®, un autre comprimé doit être pris.
- ellaOne® peut être utilisé à n'importe quel moment du cycle menstruel.
- Si les règles ont du retard ou en cas de symptômes évocateurs, toute grossesse doit être exclue avant d'administrer ellaOne®.

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit ellaOne en vigueur.

(2) Gemzell *et al.* Emergency contraception-mechanism of action. Contraception 87(2013):300-308.

- Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont les suivants : **troubles de l'humeur, maux de tête, sensations vertigineuses, nausées, douleurs abdominales, vomissements, myalgies, douleurs dorsales, dysménorrhée, douleurs pelviennes, sensibilité des seins, fatigue.**
- La grande majorité des réactions indésirables rapportées lors des études cliniques du développement d'ellaOne® était d'intensité légère ou modérée et disparaissait spontanément.

Pour une information complète sur les effets indésirables, se reporter aux mentions légales du produit disponibles à la fin de ce document.

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit ellaOne en vigueur.

- Interaction médicamenteuse théorique et possible avec les **inducteurs du CYP 3A4** (risque de diminution de l'efficacité d'ellaOne®) : **rifampicine, phénytoïne, phénobarbital, carbamazépine, éfavirenz, fosphénytoïne, névirapine, oxcarbazépine, primidone, rifabutine, millepertuis** (*Hypericum perforatum*).
- Interaction médicamenteuse possible avec les produits qui augmentent le pH gastrique (risque de diminution de l'efficacité ellaOne®) : **inhibiteurs de la pompe à protons, antiacides, antagonistes du récepteur H2**.

CONTRACEPTION D'URGENCE ET TRAITEMENTS ANTI-RÉTROVIRAUX ⁽³⁾

Si un traitement par le ritonavir est obligatoire, il aura :

- Un effet inhibiteur sur le CYP3A4 en début de prise
- Puis un effet inducteur après 6 à 10 jours de traitement

Si nécessité d'un traitement anti-rétroviral préventif (rapport sexuel non protégé avec un partenaire à statut sérologique non connu) :

→ contraception d'urgence orale.

Si traitement anti-rétroviral en cours :

- DIU au cuivre à privilégier, sinon, contraception d'urgence orale ;
- vérification systématique du taux de β HCG trois semaines après la prise.

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit ellaOne en vigueur.

(3) Coutin A. A propos des recommandations sur la contraception d'urgence du rapport Yeni 2010 sur la prise en charge des personnes exposées au VIH. N'y a-t-il rien de nouveau à proposer ? J Gyn Obst Biol Reprod (2011) 40, 273-275.

Au cours du programme de développement clinique :

- une minorité de femmes (8,7 %) a signalé des saignements intermenstruels d'une durée moyenne de 2,4 jours ;
- dans la plupart des cas (88,2 %), ce saignement était peu abondant (spotting).

- Après la prise d'ellaOne®, **les règles peuvent parfois survenir quelques jours avant ou après la date prévue.**
- Si elles ont un retard de plus de 7 jours, si les saignements menstruels sont anormaux, s'il existe des symptômes évoquant une grossesse ou au moindre doute, un test de grossesse doit être réalisé.