

NEVIRAPINE Mylan

POURQUOI PRENDRE NEVIRAPINE ?



NEVIRAPINE est un médicament antirétroviral (ARV) toujours indiqué en association avec au moins deux autres ARV, chez les patients infectés par le VIH. Ce traitement ne peut pas guérir l'infection à VIH mais contribue à la contrôler. Il a pour but d'aider votre organisme en bloquant la multiplication du virus (diminution de la charge virale), d'améliorer et de préserver vos défenses immunitaires (augmentation des CD4). Ainsi, le traitement ARV vous protège du risque d'apparition ou de rechute des maladies opportunistes.

NEVIRAPINE est un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI), qui, associé à d'autres ARV, permet de stopper la multiplication du VIH de type 1.

Nevirapine est la Dénomination commune internationale (DCI) de cette molécule, identique dans tous les pays. Elle est le générique de VIRAMUNE® et, par conséquent, ne doit en aucun cas lui être associée.

Bien que contrôlé par les médicaments, le virus est toujours présent dans l'organisme et le risque de transmission subsiste. Le préservatif est un moyen efficace de prévenir la transmission du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles.

BIEN PRENDRE NEVIRAPINE



L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prise de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative. Une interruption, même sur une courte période, pourrait entraîner une augmentation de votre charge virale (**par reprise de la multiplication VIH**). De plus, votre type de virus pourrait devenir résistant à votre traitement, c'est-à-dire insensible à l'effet de certains médicaments, ce qui pourrait le rendre plus difficile à traiter.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmière) ou bien encore avec une association de lutte contre le sida. Ils peuvent vous aider et vous orienter vers des consultations d'éducation thérapeutique. Ne laissez pas la situation se dégrader, réagissez. Il serait dommage qu'un traitement qui fonctionne perde de son efficacité.

Que faire si :


Vous avez pris plus que la dose prescrite. Vous pouvez présenter un risque accru de développer des effets indésirables. Contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le service d'urgence de l'hôpital le plus proche pour avis ;

Vous avez oublié de prendre votre comprimé de NEVIRAPINE et vous vous en apercevez dans les 8 heures, prenez un comprimé dès que possible. Ensuite, prenez le comprimé suivant à l'heure de prise habituelle. Si cela fait plus de 8 heures après l'heure habituelle : ne prenez pas la dose oubliée. Prenez le comprimé suivant à l'heure prévue ;

Vous avez vomi après avoir pris votre comprimé, demandez à votre médecin ou votre pharmacien si vous devez reprendre un comprimé. Et parlez-en à votre médecin lors de la prochaine consultation ou à votre pharmacien lors du renouvellement de votre traitement ;

Vous êtes co-infectés par le VIH et le virus de l'hépatite B (VHB) : il est indispensable que votre médecin en soit informé pour exercer une surveillance particulière de votre fonction hépatique.

COMMENT PRENDRE NEVIRAPINE ?



NEVIRAPINE doit être initié par des médecins expérimentés dans le traitement de l'infection par le VIH. Il ne doit jamais être pris en monothérapie. Le traitement par NEVIRAPINE doit être instauré progressivement pour réduire les risques d'intolérance.

Pendant les 14 premiers jours : 1 comprimé à 200 mg par jour.

À partir du quinzième jour : 1 comprimé à 200 mg deux fois par jour.

Si des troubles (notamment cutanés) surviennent durant les 14 premiers jours, n'augmentez pas la dose, même si vous arrivez au quinzième jour. Contactez votre médecin qui décidera de la suite du traitement.

Il est recommandé d'avaler les comprimés avec un grand verre d'eau, avec ou sans nourriture, et de ne pas les mâcher, les croquer, ni les écraser.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



Si vous avez des problèmes de foie ou des antécédents de maladie du foie, y compris une hépatite chronique active, parlez-en à votre médecin. Si vous souffrez d'une insuffisance hépatique sévère, NEVIRAPINE ne doit pas être utilisée. Les patients traités par des médicaments antirétroviraux tels que NEVIRAPINE présentent un risque plus élevé de problèmes hépatiques sévères pouvant nécessiter l'arrêt du traitement, notamment durant les 18 premières semaines. Votre médecin surveillera votre foie pendant votre traitement.

Si vous utilisez une contraception orale (pilule progestative ou œstroprogestative) : NEVIRAPINE diminue l'efficacité de ces contraceptifs. Vous devez utiliser une autre méthode contraceptive en complément (par ex. préservatifs).

Si vous avez un désir de grossesse, parlez-en à votre médecin. Le médecin et vous déciderez du meilleur traitement à prendre dans ce cas particulier.

N'allaites pas pendant le traitement par NEVIRAPINE. Cette molécule passe dans le lait maternel. D'une manière générale, il est recommandé aux femmes infectées par le VIH (même traitées) de ne pas allaiter.

Surveillez votre peau : des éruptions cutanées graves peuvent survenir chez des patients traités par NEVIRAPINE, généralement au cours des quatre premiers mois de traitement. Si vous avez des boutons, des taches avec éventuellement un gonflement de la peau, consultez immédiatement votre médecin. Si cela se produit au cours des deux premières semaines de traitement, consultez rapidement votre médecin qui déterminera la marche à suivre.

Une surveillance biologique avant et sous traitement est impérative (dosage des transaminases) : en effet, la prise de ce traitement peut entraîner des anomalies de la fonction hépatique, notamment en cas de co-infection par les virus de l'hépatite B ou C.

INTERACTIONS

Avec votre traitement, vous ne devez pas prendre :

Médications à base de plantes contenant du millepertuis (ou *Hypericum perforatum*).

Interactions avec d'autres médicaments



Prendre des ARV n'est pas anodin, ils sont susceptibles d'interagir avec d'autres traitements. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, même acheté sans ordonnance. Prudence aussi avec les produits à base de plantes, certains aliments (patates douces, pamplemousse, jus de pamplemousse...), l'alcool et les drogues récréatives.

Certains médicaments sont à prendre avec précaution, votre médecin adaptera les doses si nécessaires.

Les contraceptifs oraux comme méthode unique de contraception sont déconseillés sous NEVIRAPINE. Une méthode de contraception mécanique (par exemple, préservatif) devra être utilisée en association ;

Anticoagulants : Coumadine® (*warfarine*), (Mini)-Sintrom® (*acénocoumarol*), Previscan® (*fluindione*) : surveillance accrue de l'INR ;

Antibiotiques : Zeclar®, Naxy® (*clarithromycine*) : respectez un intervalle d'au moins 2 heures avec votre traitement ;

Antifongiques/antiparasitaires : Triflucan® (*fluconazole*), Sporanox® (*itraconazole*) ;

Traitement de la dépendance aux opiacés : méthadone.

Médicament générique : composition et excipients

Un médicament générique est identique au médicament d'origine (dit « princeps »). Il présente la même forme (gélule, comprimé, solution...) et il a la même composition qualitative et quantitative en principe(s) actif(s). Le principe actif est exactement le même : présent dans la même quantité que dans le médicament d'origine, il est « bioéquivalent » (c'est à dire qu'il engendre les mêmes effets) et tout aussi efficace. Entre les deux médicaments, seule une chose peut effectivement différer : les composants d'enrobage, appelés excipients.

La NEVIRAPINE Mylan contient le même excipient à effet notoire que le médicament d'origine : le lactose.

EFFETS INDÉSIRABLES



Tous les médicaments sont susceptibles de provoquer des effets indésirables. Si vous ressentez l'un de ces effets, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique évidemment à tout effet indésirable, y compris ceux qui ne seraient pas indiqués ici.

Consultez rapidement votre médecin si vous présentez un des symptômes suivants :

- **des problèmes cutanés** (boutons, rougeurs) ou accompagnés de signes généraux tels que fièvre, lésions de la bouche, conjonctivite, gonflement du visage, douleurs musculaires ou dans les articulations. Votre médecin vous indiquera peut-être d'arrêter votre traitement. N'augmentez pas la posologie de NEVIRAPINE si vous avez de tels symptômes. Une surveillance étroite est nécessaire pendant les 4-5 premiers mois du traitement (et surtout les six premières semaines) ;
- **des nausées**, une perte d'appétit, la peau jaune, des selles décolorées et des douleurs au niveau du foie : ils peuvent être évocateurs d'une hépatite et doivent vous inciter à consulter immédiatement votre médecin.

Les effets indésirables fréquents

De façon beaucoup plus fréquente, d'autres effets indésirables peuvent survenir. Ils sont bien moins graves et la plupart sont temporaires (2 à 6 semaines). Si vous ressentez l'un de ces effets (liste non exhaustive) et que vous êtes trop incommodé, parlez-en avec votre médecin.

Troubles cutanés : éruptions cutanées (boutons rouges ou taches avec parfois des ampoules et un gonflement de la peau), rougeur, démangeaisons ;

Troubles digestifs : nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée ;

Troubles généraux : fièvre, fatigue, douleurs musculaires ;

Troubles du système nerveux : maux de tête ;

Modification de la répartition de la masse grasse corporelle (lipodystrophie) : les traitements par association d'ARV ont été associés, chez les patients infectés par le VIH, à une redistribution de la masse grasse corporelle ;

Des analyses sanguines peuvent également montrer une : augmentation des enzymes hépatiques, une diminution des globules blancs (risque d'infections), une anémie (faible nombre de globules rouges).

Commandez nos outils pratiques en ligne

www.actions-traitements.org



Ligne d'écoute

01 43 67 00 00

du lundi au vendredi de 15 h à 18 h



ACTIONS TRAITEMENTS

190 boulevard de Charonne - 75020 PARIS

Tél : 01 43 67 66 00 - Fax : 01 43 67 37 00

Courriel : at@actions-traitements.org

Commandes : www.actions-traitements.org

Suivez-nous sur [facebook](#) et [twitter](#).


Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d'Actions Traitements, association de patients. Il n'est pas exhaustif : n'hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique change rapidement, imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin.



infocarte 32

Édition février 2015

NEVIRAPINE Mylan



200MG

INNTI

névirapine

NVP

générique

