

INTERACTIONS

Avec votre traitement, vous ne devez pas prendre :

Médications à base de plantes : le millepertuis sous toutes ses présentations dont Mildac®, Procalmil®, Prosoft®, Euphyptertuis®.

Ces médicaments peuvent diminuer l'efficacité de TIVICAY® et des médicaments qui y sont associés.



Interactions avec d'autres médicaments

Prendre des antirétroviraux n'est pas anodin. Ils sont susceptibles d'interagir avec d'autres traitements. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, même acheté sans ordonnance. Prudence aussi avec les produits à base de plantes, certains aliments (jus de pamplemousse...), l'alcool et les drogues récréatives.

Certains médicaments nécessitent des précautions particulières ou sont à éviter. Votre médecin adaptera les doses si nécessaire ou bien préconisera une surveillance plus rapprochée.

Compléments multivitaminés : à prendre à distance de TIVICAY®, soit 2 heures après ou 6 heures avant.

Traitement des brûlures gastriques ou reflux gastro-œsophagien : Gastropax®,

Gastropulgit®, Gelox®, Maalox®, Moxydar®, Pepsiduo®, Phosphalugel®, Rocgel®, Topaal®, Xolaam® (hydroxyde d'aluminium et/ou de magnésium), Gaviscon®, Gavisconell®, Neutroses®, Rennie® (carbonate de calcium). Ces médicaments sont à prendre à distance du TIVICAY®, soit 2 heures après ou 6 heures avant.

Supplémentation en fer et en calcium : à prendre à distance de TIVICAY®, soit 2 heures après ou 6 heures avant.

Antiépileptiques : Gardenal®, Alepsal®, Kaneuron® (phénobarbital), Di-Hydan® (phénytoïne), Tegretol® (carbamazépine), Trileptal® (oxcarbazépine).

Traitement du diabète : Glucophage®, Glucovance® (metformine) ou tout médicament contenant de la metformine en association (Janumet®, Komboglyse®, Velmetia®, Eucreas®, Icandra®).

Antiarythmique : dofétilide.

Antibiotiques utilisés contre certaines infections comme la tuberculose : Rifadine®, Rifater®, Rifinah®, Rimactan® (rifampicine).

EFFETS INDÉSIRABLES



Tous les médicaments sont susceptibles de provoquer des effets indésirables. Si vous ressentez un quelconque effet, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cela s'applique évidemment à tout effet qui ne serait pas indiqué ici.

Consultez rapidement votre médecin si vous constatez l'apparition ou l'aggravation de certains symptômes :

Éruption cutanée sévère ou éruption cutanée accompagnée de fièvre, malaise général, fatigue, douleurs musculaires ou articulaires, lésions buccales, conjonctivite, gonflement de la face ; jaunissement de la peau ou du blanc des yeux ; fragilisation osseuse (accompagnée de douleurs ou parfois de fractures). Cela peut signifier une hypersensibilité à l'un des médicaments de votre traitement.

Les effets indésirables fréquents

De façon beaucoup plus fréquente, d'autres effets indésirables peuvent survenir. Ils sont bien moins graves et la plupart sont temporaires (2 à 6 semaines). Si vous ressentez l'un de ces effets et que vous êtes trop incommodé, parlez-en avec votre médecin.

Troubles généraux : maux de tête, vertiges, fatigue, insomnies.

Au niveau cutané : éruptions cutanées, démangeaisons.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée, douleur ou gêne abdominale et rarement, baisse ou augmentation de l'appétit.

Des analyses sanguines peuvent montrer une augmentation du taux de créatine kinase (rarement accompagnée de douleurs et faiblesses musculaires) ; des enzymes du foie (ALAT et ASAT) et de la bilirubine ; du taux de créatinine.



LIGNE D'ÉCOUTE

01 43 67 00 00

du lundi au vendredi de 15 h à 18 h

COMMANDEZ NOS OUTILS EN LIGNE

www.actions-traitements.org



infocarte 29

Édition septembre 2014

TIVICAY®



50 MG

Inhibiteur d'intégrase

Dolutégravir



ACTIONS TRAITEMENTS

190 boulevard de Charonne - 75020 PARIS

Tél : 01 43 67 66 00 - Fax : 01 43 67 37 00

Courriel : at@actions-traitements.org

Commandes : www.actions-traitements.org

Suivez-nous sur **facebook** et **You Tube**.

Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d'Actions Traitements, association de patients. Il n'est pas exhaustif ; n'hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique change rapidement, imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin.



les outils d'Actions Traitements