



POURQUOI PRENDRE SOVALDI® ?

SOVALDI® est un médicament antiviral qui contient du sofosbuvir, un inhibiteur de polymérase, actif sur le virus de l'hépatite C (VHC). Il est toujours associé à d'autres médicaments et prescrit uniquement chez l'adulte (18 ans et plus) dans le cadre du traitement de l'hépatite C chronique.

Il a pour but de bloquer la multiplication du VHC.

SOVALDI® est associé à la ribavirine ; au peg-interféron alpha, plus la ribavirine ; ou à d'autres médicaments anti-VHC en cours de développement. Cette association permet d'éliminer la présence du virus dans votre organisme et d'arrêter la progression de la maladie hépatique.

Ce traitement est initié et surveillé par un médecin expérimenté. Sa durée dépend des médicaments co-administrés et du génotype du VHC. Elle peut être de 12 à 24 semaines.

BIEN PRENDRE SOVALDI®



L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prise de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmière) ou une association spécialisée dans l'information sur le VHC. Ceux-ci peuvent vous aider et vous orienter vers des consultations d'éducation thérapeutique afin que cette situation ne se dégrade pas.

Que faire si :

Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous devez contacter immédiatement votre médecin ou le service des Urgences le plus proche, pour conseil. Conservez le flacon de comprimés avec vous, pour pouvoir décrire facilement ce que vous avez pris.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé de SOVALDI® :

- si vous vous en rendez compte dans les 18 heures qui suivent l'heure de prise habituelle, vous devez prendre le comprimé le plus tôt possible. Prenez ensuite la dose suivante comme prévu ;

- si vous vous en rendez compte plus de 18 heures après l'heure de prise habituelle, attendez et prenez la dose suivante comme prévu. Ne prenez pas une double dose.

Vous avez vomi après avoir pris votre comprimé de SOVALDI® :

- si cela fait moins de 2 heures, prenez un autre comprimé.
- si vous vomissez plus de 2 heures après la prise, il est inutile de prendre un autre comprimé : attendez l'heure de la prochaine prise.

COMMENT PRENDRE SOVALDI® ?



Vous devez prendre 1 comprimé dosé à 400 mg 1 fois par jour, par voie orale, à la même heure tous les jours, avec de la nourriture. Votre médecin vous dira combien de temps prendre ce médicament et ceux qui l'accompagnent, puisque SOVALDI® doit toujours être utilisé en association.

Le comprimé de SOVALDI® ne doit pas être coupé, croqué ou écrasé.

Il n'est pas recommandé de réduire la dose de SOVALDI®.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



Le sofosbuvir doit être prescrit en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection à VHC.

En cas d'effet indésirable grave lié au peg-interféron alpha, celui-ci peut être réduit voire arrêté ; le traitement par SOVALDI® peut alors être poursuivi avec la ribavirine seule.

En cas de survenue d'anomalie biologique ou clinique due à la ribavirine, celle-ci peut être réduite, ou arrêtée.

Attention : en cas d'arrêt définitif de tous les médicaments utilisés en association avec le sofosbuvir, **celui-ci doit être arrêté.**

Il est très important de consulter les notices des médicaments prescrits en association avec le sofosbuvir.

Si vous souffrez d'une maladie rénale sévère, SOVALDI® ne vous est pas recommandé. Avant de vous prescrire ce médicament, votre médecin évaluera votre fonction rénale (examens sanguins) et surveillera vos reins pendant la durée du traitement.

Si vous êtes en âge de procréer :

- lorsque le sofosbuvir est utilisé en association avec la ribavirine, ou le peg-interféron alpha plus la ribavirine, les femmes et les hommes en âge de procréer ou leurs partenaires sexuel(le)s

doivent utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement, et jusqu'à 7 mois après la fin du traitement, comme cela est recommandé **dans la notice de la ribavirine (consultez-la pour plus d'informations ou parlez-en avec votre médecin ou avec votre pharmacien).**

- toutes les précautions doivent être prises afin d'éviter une grossesse chez les patientes et chez les partenaires féminines des patients prenant de la ribavirine. Aucune méthode contraceptive n'étant totalement fiable, il est impératif que les femmes en âge de procréer et leurs partenaires utilisent simultanément deux méthodes contraceptives efficaces, pendant le traitement et dans les 6 à 7 mois qui suivent la fin du traitement.

N'allaitez pas pendant le traitement. Un risque pour les nourrissons ne peut être exclu. Par conséquent, le sofosbuvir ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Si vous devez conduire : fatigue, troubles de l'attention, vertiges et vision floue ont été rapportés. Ne conduisez qu'en l'absence de ces effets indésirables.

